

University of Groningen

Over haemodynamische verschijnselen bij stenoses

Vries, Hendrik de

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1959

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Vries, H. D. (1959). *Over haemodynamische verschijnselen bij stenoses*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN.

I

De uitdrukking "relatieve pulmonaalstenose" bij geruisen die ontstaan door vergrote volumesnelheid van het bloed in de stam van de art. pulmonalis is misleidend.

II

De haemodynamische verhoudingen bij aangeboren hart-gebreken welke gepaard gaan met polycythaemie worden niet verbeterd door maatregelen welke een verlaging van de viscositeit van het bloed beogen.

III

In de formule voor de berekening van het hartminuutvolume uit de arteriele kleurstofverdunningscurve volgens de Forward Triangle methode is de factor K afhankelijk van de frequentie-karakteristiek van de registratie apparatuur.

IV

Het verdient aanbeveling bij caustische verbranding van de oesophagus 24 tot 36 uur te wachten alvorens corticosteroiden te geven.

V

Parapsoriasis guttata acuta is een vorm van arteriolitis allergica cutis.

VI

Het is onwaarschijnlijk dat adenomateuze darmpoliepen overgaan in carcinoom.

VII

Bij het vermoeden van resorptiestoornissen in de dunne darm is de d-xylose proef als screening methode een waardevolle aanwinst.

VIII

De anaemie met aplastisch karakter die soms na wisseltransfusies wegens Rhesus-antagonisme wordt gezien, moet worden beschouwd als een gevolg van nog steeds aanwezige Rhesus-antilichamen.

IX

De kortdurende intraveneuze barbituraat-narcose zonder toevoer van extra zuurstof is gevaarlijk.

X

Het fiscale standpunt ten aanzien van de aftrekbaarheid van de kosten verbonden aan de verwerving van de Doctorstitel dient te worden herzien.

XI

De veiligheid op de weg is er mee gediend als op kruispunten het verkeer van links voorrang krijgt.